

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Oxitocină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO"Brovafarma", Ucraina, reg. Kiev, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

Tel/fax +38(04594) 6-26-25; 6-63-20

e-mail: brovafarma@ukr.net

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Oxitocină, soluție injectabilă. 1 ml de preparat conține în calitate de substanță activă 10 IU de oxitocină și excipienți: clorbutanol și apă apirogenă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Femelelor tuturor speciilor de animale domestice (vacii, iepe, oi, capre, scoafe, cățele și pisici în caz de: hipo- și atonie uterină, hemoragii uterine, retenții placentare, pentru sporirea involuției uterine, pentru eliminarea laptelui în cazul mamitelor, în tratament complex a endometritelor și scoafelor în tratamentul agalaxiei.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează în caz de exces de volum al fătului sau în distocii prin prezentări sau poziții anormale, torsiunea uterului, toxicoze.

5. REACȚII ADVERSE

La administrare conform instrucțiunii, reacții adverse apar foarte rar. În cazul administrării intravenoase rapid se poate produce hipotensiunea.



6. SPECII ŢINTĂ

Vaci, iepe, oi, capre, scroafe, cățele și pisici .

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Subcutan sau i/muscular, 1 dată în doză de (UI):

Vaci, iepe - 30-60;

Oi, capre -10-15;

Scroafe - 20-30;

Cățele -5-10;

Pisici -2-3.

La necesitatea acțiunii urgente, se admite administrarea i/venoasă simultan cu glucoza. În așa caz doza de oxitocină se micșorează cu 30%.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, în loc răcoros sau frigider, la $T^{\circ}C+3+12^{\circ}C$. Se permite transportarea (nu mai mult de 3 zile) la $T^{\circ}C$ pînă la $25^{\circ}C$. A se feri de îngheț!

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Oxitocina nu trebuie administrată în timpul gestației înainte de termen, ea declanșînd prematur travaliul. Nu se administrează în caz de piometrii (infecții ale uterului) deoarece poate produce ruperea uterului.

Precauții speciale pentru utilizare la animale: medicamentul va fi administrat numai la indicațiile și sub supravegherea medicului veterinar. În cazul utilizării oxitocinei pentru inducerea fătării, se va ține cont ca dilatarea cervicală să se fi produs înaintea administrării oxitocinei. În caz contrar se pot produce rupturi uterine și chiar moartea fătului.

Adrenalina reduce efectul oxitocinei asupra uterului sau glandei mamare. De aceea, pentru a nu speria animalul, acesta va fi conțenționat cu blîndețe de stăpîn sau îngrijitor.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Se va manipula produsul cu grijă pentru a se evita auto-injecția accidentală.



Femeile însărcinate trebuie să evite contactul direct cu produsul. În caz de auto-injectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați acestuia prospectul produsului sau eticheta.

12. PERIODA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii. A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj. După deschiderea ambalajului primar-7 zile.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fiole a câte 2ml, 5ml, 10ml sau flacoane din sticlă a câte 5ml, 10ml, 20ml, 50ml, 100ml, 200ml.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

07.04.2015

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

