

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Defensor® 3

Virus inactivat vaccin antirabic pentru imunizarea împotriva rabiei a câinilor, pisicilor, dihori, taurinelor și ovinelor

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

-Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

-Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.

-Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

-Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.

Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1048 Louvain-la-Neuve
Belgia

Numele și adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriilor de produs

Zoetis Inc
Kalamazoo
MI 49007
USA

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Defensor® 3 Virus inactivat vaccin antirabic

Substanța activă :

Fiecare doză (1 ml) de Defensor® 3 conține:

Virus rabic omorât, tulpina PV-Paris/BHK/purif. Pass 3, SVR-289

Minimum: 0.96 RP

Excipienți:

Gentamicină ≤ 30 µg/ml

Merthiolat ≤ 0.01% W/V

Adjuvant: - Hidroxid de aluminiu 2 % Al₂O₃ 10 ± 1 % V/V



3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Defensor® 3 este recomandat pentru imunizarea împotriva rabiei a câinilor, pisicilor, dihorilor, taurinelor și ovinelor sănătoase în vârstă de peste 3 luni.

4. CONTRAINDICAȚII

Acest medicament este eficace dacă este administrat la animalele sănătoase. Un răspuns imun protectiv poate să nu fie obținut dacă animalele vaccinate sunt în perioada de incubație a unei boli infecțioase, sunt malnutrite sau parazitate, stresate datorită condițiilor de mediu în care trăiesc, sunt imunosupresate.

5. REACȚII ADVERSE

Nu s-a raportat apariția de efecte indезirabile atunci când vaccinul a fost administrat conform recomandărilor.

La fel ca și alte vaccinuri, după utilizare poate apare o reacție de tip anafilactic. Antidotul inițial este epinefrina după care trebuie utilizată o terapie de susținere.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, dihorii, taurine și ovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de folosire se agită fiola și conținutul se injectează subcutanat sau intramuscular.

Câini și pisici:

Indicații generale: Se va administra aseptice 1 ml subcutanat. Câinii pot fi vaccinați subcutanat sau intramuscular.

Vaccinarea primară: se va administra o singură doză de 1-ml la câinii și pisicile în vârstă de 3 luni sau mai mult. O nouă doză trebuie administrată 1 an mai târziu.

Revaccinarea: se recomandă revaccinarea la fiecare 3 ani cu o singură doză.

Dihori:

Indicații generale: Se va administra aseptice 1 ml subcutanat.

Vaccinarea primară: se va administra o singură doză de 1ml în vârstă de 3 luni sau mai mult. O nouă doză trebuie administrată 1 an mai târziu.

Revaccinarea: Se recomandă revaccinarea anuală cu o singură doză.

Taurine și ovine:

Indicații generale: Se va administra aseptice 2 ml intramuscular.

Vaccinarea primară: se va administra o singură doză de 2 ml la vacile și oile sănătoase în vârstă de 3 luni sau mai mult. O nouă doză trebuie administrată un an mai târziu.

Revaccinarea: Se recomandă revaccinarea anuală cu o singură doză.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu se vor vaccina animalele cu 21 de zile înainte de sacrificare.



9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se depozita și transporta la temperaturi de refrigerare (+2°-+7°C).

Ferit de lumină.

A nu se congela.

A nu se folosi după data de expirare înscrisă pe etichetă.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Vaccinați doar animalele sănătoase.

Personalul implicat și cei care participă la vaccinarea puilor trebuie să respecte principiile generale de igienă.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 de luni.

13. STATUT LEGAL

A se elibera numai pe bază de prescripție veterinară

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane de plastic de 1, 10, și 25 doze, prevăzute cu un dop de cauciuc, sigilat cu o bandă de aluminiu.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

08/2019

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

