

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Stop-prurit^R spray

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO"API-SAN", or.Moscova, str.Ac.Arțimovicia, 3/1, ap.222

OOO"Apicenna", 123242, or.Moscova, str. Drujinnikovskaia,

15, et.5, c I, oficiu 532/5

89626252752

e_karbysheva@apicenna.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Stop-prurit^R spray (*Stop-itch spray*)-soluție pentru uz extern. În calitate de substanțe active în 1 ml conține: triamcinolon acetonidă-0,5 mg, cloramfenicol-5 mg, metronidazol-10 mg, clorură de lidocaină-50 mg și excipienți: alcool etilic, dimetilsulfoxid, extract de gălbenele și politolenglicol-400.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Stop-prurit^R spray se indică câinilor și pisicilor în tratamentul dermatitelor acute, cronice (dermatite atopice, eczeme, neurodermite difuze, alopecie, dermatite infectate, reacții locale la înțepăturile de insecte), otite alergice și de etiologie bacteriană.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului (inclusiv în anamneză), boli virale și diabet zaharat. Nu se administrează intraauricular în caz de timpan perforat, animalelor gestante și în lactație, cățeilor și motănașilor pînă la vîrsta de 8 săptămîni, animalelor productive.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită a animalelor la componentele preparatului, în rare cazuri animalele pot manifesta apatie, salivare, dereglări gastrointestinale. În astfel de cazuri, administrarea se oprește și se indică terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Cîini, pisici.



7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În tratamentul dermatitelor, pe suprafața afectată, după o toaletare, se pulverizează preparatul Stop-pririt^R spray în strat subțire, de două ori pe zi. Cura fiind de 10 zile. Flaconul se fixează vertical și se pulverizează de la distanța de 10-15 cm. Otitele se tratează prin pulverizarea preparatului în interiorul pavilionului urechii până la umectare uniformă. În prealabil pavilionul urechii se toaletează (se curăță de cruste și eliminări). După aplicare, pavilionul urechii se masează ușor pentru o difuziune uniformă. Aplicarea se efectuează de 2-3 ori pe zi, timp de 5-7 zile. Cura poate fi prelungită la discreția medicului veterinar.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 0°C+25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Pentru a nu permite lingerea preparatului de pe suprafețele prelucrate, animalului i se îmbracă botniță sau guler de protecție care se scoate peste 15-20 minute după aspersare. A se evita devierile de la schema de bază a administrărilor pentru a nu diminua eficiența preparatului. În caz de omitere a unei prelucrări, aplicarea se reea în aceeași doză conform aceeași scheme.

12. PERIODA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polimer cu pulverizator a câte 15, 30, 50, 75 și 100 ml.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

11.12.2018

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenita 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR