

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Stop-intim^R picături

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO"API-SAN", or.Moscova, str.Ac.Arțimovicia, 3/1, ap.222

OOO"Apicenna", 123242, or.Moscova, str. Drujinnikovskaia,

15, et.5, c I, oficiu 532/5

89626252752

e_karbysheva@apicenna.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Preparatul Stop-intim^R picături este o suspensie perorală care conține în 1 ml în calitate de substanță activă, megestrol acetat-20 mg și adjuvanți:

polisorbat-80, polivinilpirolidon, Na-carboximetilceluloză, glicerol și polietilenglicol-400.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Stop-intim^R picături se indică pisicilor (femelelor) pentru prevenirea sau întreruperea căldurilor; motanilor-pentru diminuarea activității sexuale și corectarea comportamentului.

4. CONTRAINDICAȚII


Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului (inclusiv în anamneză), boli a tractului urinar, tumori și diabet. Nu se administrează animalelor imature, în perioada de gestație și lactație.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită a animalelor la componentele preparatului sau în caz de administrare îndelungată e posibilă salivare abundentă, vomă, modificare a apetitului, reacții de comportament și hipertrofie mamară. În astfel de cazuri administrarea se stopează și se recurge la tratament simptomatic.

6. SPECII ȚINTĂ

Pisici.



7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Stop-intim^R picături se administrează animalelor peroral, individual cu 1-2 ore pînă la hrănire, picurînd cu picurătorul pe rădăcina limbii sau pe deliciu.

Dozajul depinde de sex, greutatea animalului și scopul administrării.

Pisicilor, preparatul Stop-intim^R picături se indică:

-prevenirea căldurilor - în perioada anestrului, 1 dată în săptămîină, 4 picături per animal.

Cura de administrare - nu mai mult de 18 luni. Repetat se va administra după manifestarea ciclului fiziologic normal.

-Înteruperea căldurilor – la apariția primelor simptome a căldurilor (dar nu mai tîrziu decît peste 3 zile) 5-7 ori, cu interval de 24 ore, în doză de 9 picături per animal.

Pe parcursul anului se recomandă nu mai mult de două astfel de cure.

Motanelor pentru diminuarea excitației sexuale și corectarea comportamentului, preparatul se indică în doză de 8 picături per animal.

Primele 7 zile preparatul se indică în doză zilnică, apoi încă 14 zile cîte ½ din doza zilnică.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 2°C+25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

În prealabil flaconul cu suspensie se agită minuțios timp de 1-2 minute. Nu se recomandă administrarea concomitentă a preparatului Stop-intim^R picături cu corticosteroizi. La prima administrare a preparatului animalul poate manifesta hipersalivare și sporirea apetenței. Se recomandă respectarea schemei de administrație pentru a nu diminua eficiența. În caz de omiterea a unei doze, administrarea se reia în aceeași doză, conform aceași scheme. Preparatul nu este destinat animalelor productive.

12. PERIODA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

Termen de valabilitate după prima deschidere: 14-21 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polimer cu picurător și capac swift off a cîte 2; 2,5 ml.



15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

20.09.2018

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

