

## PROSPECTUL

### 1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Brovitacoccid, pulbere orală

### 2. Compoziție

1 g conține:

#### Substanțe active:

Amprolium clorhidrat - 125 mg,

Vitamina K - 2 mg,

Vitamina A - 10000 UI

**Excipienți:** Maltodextrină

Pulbere de culoare albă sau galben pal, cu miros specific.

### 3. Specii țintă

Păsări (găini, curci, găște, fazani, porumbei).

### 4. Indicații de utilizare

Tratamentul și profilaxia păsărilor (găini, curci, găște, fazani, porumbei) în cazul eimeriozelor provocate de :

- la găini- *Eimeria acervulina*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*;
- la curci- *Eimeria adenoeidis*, *E. meleagrimitis*;
- la fazani- *Eimeria colchii*;
- la găște- *Eimeria anseria*, *E. nocens*, *E. truncate*;
- la porumbei- *Eimeria labbeana*.

### 5. Contraindicații

Nu se utilizează pentru găini ouătoare.

Nu se indică puilor de înlocuire cu vârsta mai mare de 4 luni.

### 6. Atenționări speciale

Nu există.

#### Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Se prepară un amestec de medicament cu nutreț sau apă într-o cantitate care nu depășește necesarul zilnic de apă potabilă. Amestecul trebuie administrat uniform pe tot parcursul zilei.

#### Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Brovitacoccid pulbere, e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

#### Păsări ouătoare:

Nu se utilizează la păsări în perioada de ouat, la păsări de reproducție și în interval de 4 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat.

#### Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Administrarea dozelor mari de tiamină, inhibă acțiunea medicamentului Brovitacoccid.

Este compatibil cu toate adaosurile de nutreț și vitaminele folosite în creșterea păsărilor.

Supradozare:

În doze recomandate nu posedă acțiune mutagenă, sensibilizantă, embriotoxică sau teratogenă, nu împiedică formarea imunității la coccidioză.

În caz de supradozaj de 4 ori față de doza recomandată reacții adverse nu au fost observate.

La apariția simptomelor de supradozaj - administrarea de Brovitacoccid se stopează și se administrează parenteral vitamina B1 (tiamina).

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

A se administra doar de către un medic veterinar.

**7. Evenimente adverse**

Administrarea de lungă durată poate duce la carența de vitamina B<sub>1</sub> în organism.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.:022-210-156.

**8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare**

Peroral, se administrează în amestec cu hrana sau apa de băut.

Păsări (găini, curci, găște, fazani, porumbei):

Profilaxie : pui de vârstă până la 2 luni, zilnic- 0,9 – 1,0g medicament /1 kg nutreț;

pui de vârstă 2 - 4 luni, zilnic - 0,7g medicament /1 kg nutreț;

4 luni-până la ouat - 0,4g medicament /1 kg nutreț;

pui de carne, curci – 1,0 g medicament /1 kg nutreț pe toată perioada de creștere

boboci, fazani, porumbei - în perioada de pericol de invazie;

Tratament – indiferent de specie și vârsta păsărilor – 2,0 g medicament /1 kg de nutreț sau 1 l apă, timp de 5-10 zile.

**9. Recomandări privind administrarea corectă**

Se prepară un amestec într-o cantitate care nu depășește necesarul zilnic.

**10. Perioade de așteptare**

Carne și organe – 7 zile.

Nu se utilizează la păsări care produc ouă sau care sunt destinate să producă ouă pentru consum uman.

**11. Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat.

A se feri de lumină.

A se păstra la temperatură de la 4 °C până la 20 °C.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

**12. Precauții speciale pentru eliminare**

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

**13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar**

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

**14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor**

240090

Container din polimer sau pachet din hârtie laminată a câte 10; 30; 50; 100g și pachete din polietilenă a câte 500 și 1000 g.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

**15. Data ultimei revizuirii a prospectului**

25/08/2021

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

**16. Date de contact**

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

OOO "Brovafarma",  
Ucraina,  
07400 or. Brovarî,  
bul. Nezavisimosti 18a,

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

**Republica Moldova**

SRL "Zoofarmagro",  
mun. Chișinău,  
str. Camenița 4a;  
tel/fax +373 022 855-071;  
+373 022 855-073;  
[zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)

**17. Alte informații**

Codul ATCvet: QP51BX52

