

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR****1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

CHEFEN

**2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

1ml soluție conține:

**Substanță activă:**

Chetoprofen – 100 mg;

**Excipienți:**

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți	Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar
Propilenglicol	440mg
Alcool etilic	0.1
Alcool benzilic	20.0mg
Hidroxid de sodiu	13.7mg
Apă purificată	Până la 1ml.

Soluție injectabilă

**3. INFORMAȚII CLINICE****3.1 Specii țintă**

Bovine, cabaline, porcine.

**3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă**

Chefen este utilizat pentru tratamentul bovinelor, porcilor și cabalinelor în cazul proceselor inflamatorii acute sau cronice ale sistemului musculo-scheletic (artrită, artroză, bursită, luxații, edem, tendovaginită, traumatisme, leziuni infecțioase ale copitelor), căilor respiratorii, metrite- sindromul de mastită agalactia, diferite forme de mastită, pentru tratamentul sindromului durerii de diverse etiologii (după operații, leziuni, colici), ca antipiretic în cazul bolilor însoțite de hipertermie și stare depresivă.

**3.3 Contraindicații**

A nu se utiliza la animale în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza la animale cu ulcer gastric sau duodenal, sindrom hemoragic, insuficiența renală sau hepatică severă.

**3.4 Atenționări speciale**

A nu se amesteca cu alte medicamente de uz veterinar într-o seringă.

**3.5 Precauții speciale pentru utilizare****Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:**

A nu se administra în același loc mai mult de 10ml de medicament de uz veterinar.

**Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

Se recomandă respectarea regulilor generale de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în timpul lucrului cu medicamentele de uz veterinar.

Când utilizați medicamentul, respectați regulile de asepsie și de fixare sigură a animalului.

**Precauții speciale pentru protecția mediului:**

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

**3.6 Evenimente adverse**

Nu există date disponibile.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, secțiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

**3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului**

Fără restricții.

**3.8 Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune**

A nu se utiliza concomitent cu alte antiinflamatoare nesteroidiene, glucocorticoizi, anticoagulante și diuretice.

**3.9 Căi de administrare și doze**

Medicamentul de uz veterinar se utilizează intramuscular sau intravenos în doze:

**Bovine** - intramuscular sau intravenos o dată pe zi, la o doză de 0,3 ml la 10 kg de greutate corporală, timp de 1-3 zile.

**Cabaline de sport** – intravenos, o dată pe zi la o doză de 1 ml la 45 kg de greutate corporală, timp de 3-5 zile. Pentru tratarea animalelor cu colici este suficientă o singură administrare. Dacă este necesar, administrarea repetată este posibilă doar după examinarea suplimentară a animalului.

**Porcine** - intramuscular o dată pe zi la o doză de 0,3 ml la 10 kg greutate corporală, timp de 1-3 zile.

**3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)**

În cazuri rare pot apărea simptome exprimate cu anorexie, vomă, diaree.

**3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, 2eterinar restricții privind utilizarea medicamentelor de uz 2eterinary antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței**

A se administra doar de către un medic veterinar.

**3.12 Perioade de așteptare**

Carnea și organe de porc - 4 zile, carnea și organe de bovine - 5 zile;

Laptele – 0 zile.

**4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE IMUNOLOGICE**

**4.1 Codul ATCvet: QM01AE03**

#### 4.2 Farmacodinamie

Chefen este un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS) cu efecte analgezice și antipiretice pronunțate. Chetoprofenul este un medicament din grupul acizilor carboxilici, derivați ai acidului propionic. Mecanismul acțiunii sale este de a înhîba sinteza prostaglandinelor și a tromboxanului și se bazează pe o înhîbare a metabolismului acidului arahidonic. În doze terapeutice, chetoprofenul înhîbă predominant COX-II (ciclooxigenaza) și, parțial, COX-I, oferind efecte antiinflamatorii, analgezice, antipiretice și antiendotoxice.

#### 4.3 Farmacocinetică

După o singură administrare intramusculară, concentrația maximă de chetoprofen în plasma sanguină este atinsă după 30 de minute. Chetoprofenul este excretat din organism în principal prin rinichi.

#### Proprietăți de mediu

Acest medicament de uz veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece substanțele active pot fi periculoase pentru organismele acvatice.

### 5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

#### 5.1 Incompatibilități majore

Este incompatibil cu alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, glucocorticoizi, anticoagulante și diuretice.

#### 5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

#### 5.3 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original al producătorului.

A se păstra în loc uscat.

A se feri de îngheț, lumină.

A se păstra la temperatură de la +4°C până la +25°C.

#### 5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoane din sticlă de culoare întunecată, închise cu dopuri de cauciuc sub rulare din aluminiu, sau recipiente din materiale polimerice a câte 10, 20, 50, 100, 200 și 400 ml.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

#### 5.5 Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.

### 6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SRL „BROVAFARMA”,

Ucraina, bd. Independență 18-a, Brovary, regiunea Kiev, 07400

### 7. NUMĂRUL(NUMERELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

240117



**8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI**

11/10/2024

**9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR  
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

10/2024

**10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR**

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).