

PROSPECT

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Ciflodex

2. Compoziție

1 ml de medicament conține în calitate de substanță activă:

Clorhidrat deciprofloxacina – 4,5 mg,

Dexametazonă – 1 mg

Excipienți:

Clorură de sodiu, tiloză, tvin-80, clorură de benzalconiu, edetat disodic, acetat de sodiu, acid acetic, acid boric, apă purificată

Picături oftalmice și auriculare, suspensie.

3. Specii țintă

Câini, pisici, iepuri decorativi.

4. Indicații de utilizare

Tratamentul câinilor, pisicilor și iepurilor decorativi în cazul inflamațiilor acute și cronice a ochilor și urechilor care apar ca urmare a acțiunii factorilor bacterieni, chimici sau traumatici – conjunctivită, blefarită, cheratită, cheratoconjunctivită, iridită, iridociclită, ulcere și eroziuni a corneei, afecțiuni posttraumatice, complicații în urma pătrunderii corpurilor străine sau compușilor agresivi, perioada pre- și postoperatorie dar și tratamentul otitei și otoreei provocate de intervenții exterioare.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

Nu se indică în cazul bolilor virale sau micotice ale ochilor și urechilor.

Nu se utilizează concomitent cu medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, cu teofilina, amfotericina și alte medicamente care elimină calciul.

A nu se utiliza în timpul vaccinărilor.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale

A se utiliza cu precauție la animale cu vârsta sub 7 zile.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Ciflodex e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu medicamentul dat.

În timpul lucrului este interzis fumatul, consumul de alimente și băuturi.

În caz de contact accidental cu pielea, suprafața se spală din abundență cu apă. În caz de îngerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Precauții speciale pentru protecția mediului

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Gestație și lactație:

A se utiliza cu precauție femelelor gestante și în lactație.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

A nu se utiliza concomitent cu medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, cu teofilina, amfotericina și alte preparate care elimină calciul și în timpul vaccinării.

Simptome de supradozaj

Ciflodex este un medicament cu toxicitate scăzută și, atunci când este utilizat în dozele recomandate, simptome specifice supradozării nu apar.

Incompatibilități majore

A nu se amesteca cu niciun alt medicament de uz veterinar

7. Evenimente adverse

Reacții adverse sau complicații în urma administrării conform prospectului dat nu apar. În urma administrării în ochi pot apărea reacții de iritare locală, prurit, lăcrimare, în rare cazuri reacții alergice. Administrarea în ochi de lungă durată poate duce la apariția glaucomului secundar, catarctei steroiene.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Înainte de administrare se agită flaconul și se administrează în sacul conjunctival câte 1-2 picături de 2-4 ori pe zi (în cazuri grave, primele 1-2 zile se administrează fiecare 2-3 ore) sau în canalul auditiv câte 1-4 picături (în dependență de greutatea corporală a animalului) de 2-3 ori pe zi.

În cazul secrețiilor purulente sau sero-purulente, mai întâi se efectuează toaletarea ochilor sau urechilor: se picură 3-4 picături și se înlătură eliminările cu un tampon steril, apoi se picură 1-2 picături.

Cura de tratament durează 5- 10 zile.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Se recomandă respectarea dozelor și intervalelor de administrare pentru a nu diminua eficiența medicamentului. În caz de omitere a unei administrări, schema se reia în aceeași doză conform aceeași scheme.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemîna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de lumină directă a soarelui și umiditate.

A se păstra la T°C de la +10 până la +25°C.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 30 zile (păstrat la T°C de la +10 până la +25°C).

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

240127

Flacon din material polimeric cu picurător, a câte 5 și 10 ml.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

11/2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

OOO "Brovafarma",
Ucraina, or. Brovarî,
bd. Nezavisimosti 18a, 07400

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Zoofarmagro,
mun. Chișinău, str. Camenița 4a
Tel/fax 373 022 855-071; 373 69827427
www.zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații

Codul ATCvet: QS03CA01

