

## PROSPECTUL

### 1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Gelmintal T, comprimate pentru pisoi și pisici mai mici de 4 kg  
Gelmintal T, comprimate pentru pisoi și pisici mai mari de 4 kg  
Gelmintal T, comprimate pentru căței și câini mai mici de 10 kg  
Gelmintal T, comprimate pentru căței și câini mai mari de 10 kg

### 2. Compoziție

Fiecare comprimat conține

#### Substanțe active:

| GELMINTAL T                             | 1 comprimat cu greutatea de: | Moxidectin | Praziquantel |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| Pentru pisoi și pisici mai mici de 4 kg | 60 mg                        | 0,4 mg     | 10 mg        |
| Pentru pisoi și pisici mai mari de 4 kg | 240 mg                       | 1,6 mg     | 40 mg        |
| Pentru căței și câini mai mici de 10 kg | 150 mg                       | 1 mg       | 25 mg        |
| Pentru câini mai mari de 10 kg          | 750 mg                       | 5 mg       | 125 mg       |

**Lista excipienților:** lactoză, amidon, aditiv alimentar „Aromă de carne Tirolskaia”, stearat de calciu, gelatină, dioxid de siliciu coloidal.

Comprimate pentru uz intern, de culoare albă, de formă ovală, marcate cu o incizie pe una din fețe.

### 3. Specii țintă

Câini și pisici.

### 4. Indicații de utilizare

Gelmintal T este indicat pentru câini și pisici adulte, căței și pisoi cu scop terapeutic și profilactic în caz de nematodozele intestinale (toxocaroză, toxoascaridoză, uncinarioză, anchilostoze, trihocefaloze), cestodoze (teniidoze, dipilidioze, echinococoză, difilobotrioze, mezocetoidoze), precum și invaziile asociate de nematodo-cestodoze și pentru prevenirea dirofilariozei.

### 5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți, inclusiv în cazurile de antecedente de disfuncții renale și hepatice severe.

Nu sunt supuse deparazitării câinii istoviți și bolnavi de boli infecțioase, câinii și pisicile cu o greutate mai mică de 0,5 kg.

### 6. Atenționări speciale

#### Atenționări speciale:

Cățele de vârstă sub 3 săptămâni și pisoi de vârstă sub 6 săptămâni nu sunt supuși deparazitării  
Nu este indicat animalelor productive.

#### Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Administrarea Gelmintal T cățelilor de rasele Collie, Sheltie, Bobtail, datorită sensibilității crescute la lactone macrociclice, se va realiza sub supravegherea unui medic veterinar.

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

În cazul efectuării deparazitării se recomandă respectarea termenilor și indicațiilor prescrise. În caz de omitere a unei doze de administrare, schema de utilizare se reia în aceeași doză, conform aceeași scheme.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:  
Când manipulați, Gelmintal T trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

La sfârșitul lucrului, mâinile trebuie spălate bine cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului ar trebui să evite contactul direct cu Gelmintal T.

În cazul reacțiilor alergice sau a ingerării accidentale a medicamentului în organism, trebuie să contactați imediat o instituție medicală (cu sine de avut prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Gestație și lactație:

În perioada de gestație și lactație medicamentul poate fi utilizat cu prudență sub supravegherea medicului veterinar.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu utilizați Gelmintal T concomitent cu alți agenți antiparazitari care conțin lactone macrociclice sau piperazină și medicamente care inhibă colinesteraza.

Supradozare:

În cazul unei supradoze de medicament, animalul poate prezenta o stare deprimată, refuză hrana, salivă excesivă și tulburări ale tractului gastrointestinal. În aceste cazuri, animalului i se prescriu enterosorbente și terapie simptomatică.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

## **7. Evenimente adverse**

De regulă, nu există efecte secundare și complicații atunci când utilizați Gelmintal T în conformitate cu indicațiile prescrise. La unele animale, este posibilă dereglări la nivelul tractului gastrointestinal și creșterea salivăției care dispar spontan și nu necesită administrare de medicamente. Î

n caz de sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului și apariția reacțiilor alergice, utilizarea sa este întreruptă și animalului i se prescriu antihistaminice și terapie simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

## **8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare**

Gelmintal T se administrează pe cale orală individual, dimineața cu o cantitate mică de hrană sau este administrat pe rădăcina limbei după hrănire într-o doză terapeutică minimă de 0,2 mg moxidectină și 5 mg praziquantel la 1 kg greutate animală, conform calculelor:



| Specia și greutatea animalului | Gelmintal T, conținutul într-un comprimat de moxidectină/praziquantel                                                                   |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pisici</b>                  | Comprimat cu greutatea de 60 mg „pentru pisoi și pisici mai mici de 4 kg”<br>moxidectină / praziquantel<br>0,4 mg / 10 mg               | Comprimat cu greutatea de 240 mg „pentru pisoi și pisici mai mari de 4 kg”<br>moxidectină / praziquantel<br>1,6 mg / 40 mg      |
| 0,5 - 1 kg                     | ½ comprimat                                                                                                                             | -                                                                                                                               |
| > 1 - 2 kg                     | 1 comprimat                                                                                                                             | -                                                                                                                               |
| > 2 - 4 kg                     | 2 comprimat                                                                                                                             | ½ comprimat                                                                                                                     |
| > 4 - 8 kg                     | -                                                                                                                                       | 1 comprimat                                                                                                                     |
| > 8 - 12 kg                    | -                                                                                                                                       | 1 + ½ comprimat                                                                                                                 |
| <b>Câini</b>                   | Comprimat cu greutatea de 150 mg „pentru căței și câini cu greutatea mai mică de 10 kg”<br>moxidectină / praziquantel<br>1,0 mg / 25 mg | Comprimat cu greutatea de 750 mg „pentru câini cu greutatea mai mare de 10 kg”<br>moxidectină / praziquantel<br>5,0 mg / 125 mg |
| 0,5 - 1 kg                     | ¼ comprimat                                                                                                                             | -                                                                                                                               |
| >1 - 2 kg                      | ½ comprimat                                                                                                                             | -                                                                                                                               |
| >2 - 5 kg                      | 1 comprimat                                                                                                                             | -                                                                                                                               |
| >5 - 10 kg                     | 2 comprimat                                                                                                                             | ½ comprimat                                                                                                                     |
| >10 - 25 kg                    | -                                                                                                                                       | 1 comprimat                                                                                                                     |
| >25 - 50 kg                    | -                                                                                                                                       | 2 comprimat                                                                                                                     |
| >50 - 75 kg                    | -                                                                                                                                       | 3 comprimat                                                                                                                     |

În scop terapeutic, deparazitarea animalelor se efectuează conform indicațiilor o singură dată; în cazul gradului înalt de invazie se recomandă repetarea tratamentului după 10 - 14 zile.

În scop profilactic în cazul nematozilor intestinali și al cestodozelor, animalele se deparazitează în doză terapeutică o dată la 3 luni, precum și cu 10-14 zile înainte de fiecare vaccinare.

Pentru a preveni dirofilarioza în regiunile nefavorabile la boală, medicamentul este utilizat în perioada primăvară-vară- toamnă: înainte de începutul zborului țânțarilor (purători ai agentului patogen *D. immitis* și *D. repens*) o dată, apoi o dată pe lună și ultima administrare cu 1 lună înainte de terminarea zborului insectelor.

Gelmintal T nu distruge dirofilariile mature sexual, dar reduce numărul de microfilarii care circulă în sânge și poate fi aplicat și la animalele infestate.

#### 9. Recomandări privind administrarea corectă

O dietă preliminară sau utilizarea de laxative nu sunt necesare înainte de deparazitare.

#### 10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

#### 11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de lumina directă a soarelui.

A se păstra separat de produsele alimentare și hrană pentru animale.

A nu se păstra la temperatură de la 0°C până la 30°C.

Partea neutilizată a comprimatului poate fi plasată într-un blister și păstrată până la următoarea deparazitare, dar nu mai mult de 3 luni de la deschiderea ambalajului.

Este interzisă utilizarea medicamentului după data de expirare.

## **12. Precauții speciale pentru eliminare**

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

## **13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar**

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

## **14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor**

Gelmintal T, comprimate pentru pisoi și pisici mai mici de 4 kg - 240058

Gelmintal T, comprimate pentru pisoi și pisici mai mari de 4 kg - 240059

Gelmintal T, comprimate pentru căței și câini mai mici de 10 kg - 240060

Gelmintal T, comprimate pentru căței și câini mai mari de 10 kg - 240061

Gelmintal T este ambalat în blistere a câte 2 comprimate, în cutii de carton împreună cu prospectul de utilizare.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate

## **15. Data ultimei revizuirii a prospectului**

07/2024

## **16. Date de contact**

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Societatea pe Acțiuni de Tip Încis Firma Științifică de Producere „Ekoprom”, Regiunea Moscova, raionul Liubertîi, or. Tomilino, str. Garșin nr.11.

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

## **Republica Moldova**

Societatea pe Acțiuni de Tip Încis Firma Științifică de Producere „Ekoprom”, Regiunea Moscova, raionul Liubertîi, or. Tomilino, str. Garșin nr.11/23.

## **17. Alte informații**

Codul ATC: QP54AB52