

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

AMITRAZ picături insectoacaricide

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

AMITRAZ, picături insectoacaricide

Substanța(e) activă(e):

- | | |
|--|----------|
| - Amitraz | - 3 mg |
| - Polihexametilen biguanid hidroclohid | - 0,5 mg |
| - Dimetilsulfoxid | - 100 mg |

Lista excipienților:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| - Ulei de floarea soarelui până la | -1 ml |
|------------------------------------|-------|

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Se indică în tratamentul bolilor insectoacaricide care afectează canalul auricular (*Otodectes cynotis, demodex spp.*).

Recomandat pentru iepuri, câini și pisici.

4. CONTRAINDICAȚII ȘI PRECAUȚII

Sensibilitatea individuală a animalelor la produs. Acțiune iritantă asupra mucoasei.



Evitați contactul cu ochii și mucoasele. Animalele tinere cu vârsta de pînă la 4 săptămîni se vor trata cu atenție.

Păstrați recipientele bine închise. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. În timpul manipulării produsului se interzice de a fuma, a bea apă, a mînca. După utilizarea preparatului mîinile se spală cu apă caldă și săpun.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

-Iepuri, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Atenție! În prealabil produsul se va încălzi la temperatura +20+25°C, se va agita flaconul 20-30 secunde.

Se curăță canalul auricular, apoi se aplică cîte 2-3 picături o dată pe zi.

6-8 administrări pînă la însănătoșirea completă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE (pentru produsele alimentare țintă)

Carne (iepuri) – 14 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

(condiții de depozitare și condiții de păstrare ale medicamentului de uz veterinar după reconstituire, diluare, prima deschidere)

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

Separat de produsele alimentare și hrana animalelor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 20 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Nu contaminați apele și canalele de scurgere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:



Animalele tinere cu vârsta de până la 4 săptămâni se vor trata cu atenție.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Produsul este dăunător dacă este înghițit sau inhalat.

A se evita ingerarea produsului și inhalarea vaporilor.

A se evita contactul produsului cu ochii și pielea.

A se spăla mâinile și orice alte părți ale corpului care au intrat în contact cu produsul.

La manipularea produsului medicinal veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal, constând din mănuși de protecție .

În timpul manipulării produsului este interzis fumatul, consumul de alimente sau de lichide.

Utilizare in perioada de gestație, lactatie sau in perioada de ouat:

Se utilizează în perioada de gestație și lactație în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Deoarece Amitraz-ul are efect imunosupresiv nu se administrează cu corticosteroizi și alte medicamente imunosupresoare (azathioprine, cyclophosphamide, etc).

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 60 zile.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane 5 ml, 10 ml, 20 ml produs ambalate individual în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

30.01.2020

NUMAI PENTRU UZ VETĒRINAR

