

PROSPECT

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Mastenit^R, suspensie intramamară.

2. Compoziție

Fiecare seringă (3,6 g) conține

Substanță activă:

Cloxacilină - 600 mg

Excipienți: benzatin diacetat, butilhidroxitoluen, dioxid de siliciu coloidal anhidru și parafină lichidă.

3. Specii țintă

Bovine (vacii).

4. Indicații de utilizare

Se indică o singură dată, în tratamentul mastitei subclinice existente la vacile care intră în perioada de repaus mamar, dar nu mai târziu decât cu 42 de zile înainte de data estimată a fătării.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la cloxacilină sau la oricare dintre excipienți.
Nu se utilizează la femele în lactație.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale

Medicamentul dat nu este prevăzut a fi utilizat animalelor tinere.
Seringa trebuie utilizată numai o singură dată, a câte una pentru fiecare sfert.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

Utilizarea medicamentului trebuie să se bazeze pe testarea sensibilității bacteriilor izolate de la animale. Dacă aceasta nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informațiile epidemiologice locale cu privire la sensibilitatea speciilor bacteriene țintă.

Trebuie luate în considerare politicile oficiale antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează medicamentul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu MastenitR e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu medicamentul de uz veterinar.

În timpul lucrului este interzis fumatul, consumul de alimente și băuturi.

După utilizare mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Gestație

Se admite spre utilizare femelelor gestante.

Lactație

Medicamentul dat nu este prevăzut a fi utilizat animalelor în lactație.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu există informații privind siguranța și eficacitatea medicamentului de uz veterinar când este utilizat cu alte medicamente de uz veterinar.

Nu se recomandă utilizarea simultană acestui medicament de uz veterinar cu alte medicamente intramamare.

Supradozare

Nu sunt depistate.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare

A se administra doar de către un medic veterinar.

Incompatibilități majore

În lipsa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

Reacții adverse sau complicații în urma administrării, conform indicațiilor din prospectul de utilizare, nu apar. În caz de apariția reacțiilor alergice se recurge la antihistaminice și terapie simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

MastenitR se administrează vacilor după ultima mulsoare înainte de repaus mamar.

În prealabil se mulge sfertul afectat, se dezinfectează mamelonul cu alcool de 70% sau un șervețel dezinfectant. Pentru a administra animalelor liniștite, este nevoie de a scoate doar vârful capacului, pentru cele neliniștite, capacul se scoate totalmente. După care alonja se introduce atent în mamelonul sfertului afectat și se infuzează tot conținutul seringii. Vârful mamelonului e necesar de strâns atent cu degetele și de al masa cu mișcări de jos în sus pentru a ridica conținutul în cisterna ugerului.

În fiecare sfert al ugerului se administrează conținutul unei seringi.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Se recomandă respectarea dozelor și condițiilor de administrare pentru a nu diminua eficiența medicamentului.

Nu utilizați Mastenit^R dacă observați semne vizibile de deteriorare.

10. Perioade de așteptare

Carne-28 de zile.

Lapte- peste 5 zile după fătare.

În caz de administrare greșită a medicamentului animalelor în perioada de lactație sau dacă fătarea a avut loc mai devreme decât peste 42 zile, atunci perioada de așteptare este de 46 zile după administrarea medicamentului de uz veterinar.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra separat de produsele alimentare și hrană pentru animale.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra la T°C de la 0°C până la 25°C.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: a se utiliza imediat, nu se va păstra.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

250010

Seringă din polimer a câte 3,6 g cu alonjă pentru administrarea suspensiei și cu capac din același material. Capacul este alcătuit din două părți: partea de sus și partea de jos pentru obținerea alonjei de lungimi diferite.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

03/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

OOO "NITA-FARM",

410010, or. Saratov, str. Osipov V.I. 1

Tel/fax +7(4852)338-600

e-mail: client@nita-farm.ru

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare

Republica Moldova

SRL Zoofarmagro,

mun. Chișinău, str. Camenița 4a

Tel/fax 373 022 855-071; 373 69827427

www.zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații

Codul ATCvet: QJ51CF02

