

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Poulvac Procerta HVT-IBD concentrat și solvent pentru suspensie injectabilă pentru pui de găină.

2. Compoziție

Fiecare doză (0,05 ml sau 0,2 ml) conține:

Substanță activă:

Herpesvirus de curcan, tulpina HVT-IBD (asociat celulelor), care exprimă gena proteinei VP2 a virusului bursitei infecțioase, viu: 3580 - 26500 UFP*.

*UFP: unități formatoare de plăci.

Concentrat: concentrat portocaliu deschis până la roz deschis.

Solvent: lichid roșu limpede.

3. Specii țintă

Pui de găină și ouă embrionate de găină.

4. Indicații de utilizare

Pentru imunizarea activă a puilor de găină de o zi și a ouălor embrionate de găină de 18-19 zile pentru

- reducerea mortalității, semnelor clinice și leziunilor cauzate de virusul bolii Marek (MD);
- prevenirea mortalității și semnelor clinice și reducerea leziunilor cauzate de virusul bursitei infecțioase (IBD).

Debutul imunității:

- MD: 7 zile după vaccinarea *in ovo* și 9 zile pentru administrare subcutanată
- IBD: 15 zile după vaccinarea *in ovo* și 12 zile pentru administrare subcutanată.

Durata imunității:

- MD: o singură vaccinare este suficientă pentru a oferi protecție pe întreaga perioadă de risc
- IBD: vârsta de 64 de zile

5. Contraindicații

Nu există.

6. Atenționări specialeAtenționări speciale:

Vaccinați doar animalele sănătoase.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Tulpina vaccinală poate fi excretată de pui de găină vaccinați timp de maximum 6 săptămâni după vaccinare și are potențialul de a se răspândi la curcani și într-o măsură foarte limitată la pui de găină.

Studiile de siguranță (inclusiv studiile de revenire la virulență la pui) au arătat că tulpina este sigură pentru curcani și pui de găină. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri de precauție, inclusiv respectarea principiilor generale de igienă și acordarea unei atenții deosebite în manipularea deșeurilor animale și a materialelor de așternut de la pui de găină vaccinați recent, pentru a evita răspândirea tulpinii vaccinale.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Azotul lichid poate provoca arsuri grave prin îngheț, iar fiolele decongelate pot exploda ocazional ca urmare a schimbărilor bruște de temperatură. Prin urmare, recipientele cu azot lichid și fiolele de vaccin trebuie manipulate numai de personal instruit corespunzător.

Echipamentul personal de protecție constând din mănuși, protecție facială sau ochelari de protecție și îmbrăcăminte care să acopere pielea trebuie purtat la manipularea medicamentului de uz veterinar începând cu retragerea din azotul lichid.

Depozitați și utilizați azotul lichid numai într-un loc uscat și bine ventilat.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Păsări ouătoare:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită în timpul perioadei de ouat.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu există informații privind siguranța și eficacitatea vaccinului când este utilizat cu alte medicamente de uz veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după alte medicamente de uz veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

Supradozare:

Nu au fost observate simptome după administrarea unei doze de vaccin de 10 ori mai mare.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore

A nu se amesteca cu niciun alt medicament de uz veterinar, cu excepția solventului recomandat pentru utilizarea cu acest medicament de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

Pui de găină și ouă embrionate de găină:

Nu se cunosc.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimentele adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Vaccinul se administrează la pui de găină prin injecție subcutanată în gât sau prin injecție *in ovo*.

O singură injecție de 0,2 ml per pui de găină în ziua eclozării, prin administrare subcutanată.

O singură injecție de 0,05 ml per ou de găină la 18-19 zile de embrionare, pe cale *in ovo*.

Prepararea vaccinului:

Pregătirea vaccinului trebuie planificată înainte ca fiolele să fie luate din azotul lichid și trebuie calculată mai întâi cantitatea exactă de fiole de vaccin și cantitatea de solvent necesară. Nu există informații disponibile cu privire la numărul de doze de pe fiole odată ce acestea sunt scoase din tije de crioconservare.

Trebuie acordată o atenție deosebită pentru a vă asigura că amestecurile de fiole cu un număr diferit de doze sunt evitate și că este utilizat volumul corect de solvent (Poulvac Solvent).

Pentru utilizare subcutanată, reconstituiți fiecare 2000 de doze cu 400 ml de Poulvac Solvent și fiecare 4000 de doze cu 800 ml de Poulvac Solvent.

Pentru utilizare *in ovo*, reconstituiți fiecare 2000 de doze cu 100 ml de Poulvac Solvent și 4000 de doze cu 200 ml de Poulvac Solvent. Solventul trebuie să fie la temperatura camerei (15 °C – 25 °C) în momentul amestecării cu vaccinul.

Sunt oferite tabele de prezentare pentru exemplele de diluție pentru diferitele prezentări de doze atât pentru administrarea subcutanată, cât și *in ovo*:

Pungă cu Poulvac Solvent	Număr de fiole de vaccin pentru utilizare subcutanată
Pungă cu 400 ml solvent	1 fiolă care conține 2000 de doze
Pungă cu 800 ml solvent	2 fiole ce conțin 2000 doze
Pungă cu 800 ml solvent	1 fiolă care conține 4000 doze

Pungă cu Poulvac Solvent	Număr de fiole de vaccin pentru utilizare <i>in ovo</i>
Pungă cu 200 ml solvent	2 fiole ce conțin 2000 doze
Pungă cu 400 ml solvent	4 fiole ce conțin 2000 doze
Pungă cu 400 ml solvent	2 fiole ce conțin 4000 doze
Pungă cu 800 ml solvent	4 fiole ce conțin 4000 doze
Pungă cu 1000 ml solvent	5 fiole ce conțin 4000 doze

9. Recomandări privind administrarea corectă

Reconstituirea trebuie făcută în condiții aseptice. Înainte de a scoate fiolele din recipientul cu azot lichid, protejați mâinile cu mănuși, purtați mâneci lungi și utilizați o protecție facială sau ochelari de protecție.

Se recomandă manipularea a maximum 5 fiole o dată. După îndepărtarea fiolelor, fiolele rămase trebuie puse imediat înapoi în recipientul cu azot lichid.

Scoateți fiola(ele) de vaccin din recipientul cu azot lichid și dezghețați vaccinul prin scufundarea în apă la 25 °C – 30 °C, în timp ce agitați ușor fiola(ele) pentru a dispersa conținutul. De îndată ce vaccinul din fiolă este complet dezghețat, scoateți fiola din apă, uscați-o și spargeți-o la nivelul gâtului.

Odată deschisă, extrageți încet conținutul total al fiolei cu grijă într-o seringă sterilă de unică folosință de 10 ml cu un ac de calibrul 18. Aspirați încet aproximativ 8 ml de Poulvac Solvent în seringă.

Întoarceți seringă de 5-10 ori pentru a amesteca bine conținutul. Transferați încet un volum mic de amestec în fiola goală de vaccin pentru a clăti fiola și a extrage această cantitate mică înapoi în seringă.

Transferați cu grijă întregul conținut al seringii în punga cu Poulvac Solvent. Scoateți seringă și răsturnați punga cu solvent de aproximativ 10 ori pentru a amesteca vaccinul. Vaccinul este acum gata de utilizare.

Vaccinul gata de utilizare este un lichid roșu, ușor opalescent.

În cazul în care echipamentul automat este utilizat pentru administrare *in ovo* sau subcutanată, echipamentul trebuie calibrat pentru a se asigura că se aplică doza corectă fiecărui ou sau pui de găină.

Trebuie urmate instrucțiunile de utilizare ale acestui dispozitiv.

Punga cu vaccin trebuie agitată ușor în timpul vaccinării pentru a garanta că suspensia de vaccin rămâne omogenă și că se administrează titrul corect al virusului vaccinal.

10. Perioade de așteptare

Zero zile

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Concentrat:

A se păstra și transporta în condiții de congelare în azot lichid (sau fază de vapori) la sau sub -150 °C.

Poulvac Solvent:

A se păstra la temperatură de sau sub 25 °C. A se feri de lumină.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă (solvent) sau fiolă (concentrat) după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după diluare conform indicațiilor: 2 ore.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

250025

Concentrat:

Fiolă de sticlă de tip I care conține 2000 sau 4000 de doze de vaccin.

Fiolele sunt depozitate în recipiente de crioconservare pe tije de crioconservare. Prezentarea dozei este menționată pe extremitatea fiecărui tije de crioconservare.

Poulvac Solvent:

Pungă de plastic din policlorură de vinil (PVC) și polipropilenă care conține 200 ml, 400 ml, 800 ml și 1000 ml. Solventul este ambalat separat de fiole.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

04/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Belgia

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.
Carretera De Camprodon S/n
La Vall De Bianya
17813 Girona
Spania

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Zoofarmagro
str. Camenita 4A
mun. Chisinau MD
Tel: + 373 22 855-071
E-mail: zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații

Vaccinul conține un herpesvirus de curcan viu recombinat (HVT) asociat celular, care exprimă proteina VP2 a virusului bursitei infecțioase. Vaccinul induce imunitate activă împotriva bursitei infecțioase (boala Gumboro) și a bolii Marek la pui de găină.

