

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Innovax-ND-ILT concentrat și solvent pentru suspensie injectabilă pentru puii de găină

2. Compoziție

Fiecare doza de vaccin reconstituit (0,2 ml pentru utilizare subcutanată sau 0,05 ml pentru *in ovo*) conține:

Herpesvirus viu de curcă recombinant asociat celular (tulpina HVT/NDV/ILT), ce exprimă fuziunea proteinelor virusului bolii de Newcastle și glicoproteinele gD și gI ale virusului laringotraheitei infecțioase: $10^{3.3} - 10^{4.3}$ UFP*.

*UFP – unități formatoare de plăci.

Concentrat: concentrat celular roșu deschis până la roșu închis.

Solvent: soluție limpede, roșie.

3. Specii țintă

Puii de gaina si oua de gaina embrionate.

4. Indicații de utilizare

Pentru imunizarea activă a puilor de o zi sau a ouălor embrionate în vârstă de 18-19 zile:

- pentru a reduce mortalitatea și semnele clinice cauzate de virusul bolii Newcastle (ND),
- pentru a reduce mortalitatea, semnele clinice și leziunile cauzate de virusul laringotraheitei infecțioase aviare (ILT) și virusul bolii Marek (MD).

Instalarea imunitatii: ND: vârsta de 5 săptămâni,
ILT: vârsta de 4 săptămâni,
BM: 9 zile.

Durata imunitatii: ND: 62 de săptămâni,
ILT: 62 de săptămâni,
BM: toată perioada de risc.

5. Contraindicații

Nu există.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Vaccinati doar animalele sanatoase.

Precauții speciale pentru utilizare la speciile tinta:

Deoarece acesta este un vaccin viu, tulpina de vaccin este excretată de la păsările vaccinate și se poate răspândi la curcani. Studiile de siguranță au arătat că tulpina este sigură pentru curcani. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri de precauție pentru a evita contactul direct sau indirect între puii vaccinați și curcani.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Manipularea azotului lichid trebuie să aibă loc într-o zonă bine ventilată. Innovax-ND-ILT este o suspensie de virus ambalată în fiole de sticlă și păstrată în azot lichid. Înainte de a scoate fiolele din recipientul cu azot lichid, trebuie să fie purtate echipamente de protecție constând din mănuși, mâneci lungi și o mască sau ochelari de protecție. În caz de accident pentru a preveni rănilor grave, produse fie de azotul lichid, fie de fiole atunci când scoateți o fiolă din recipient, țineți mâna cu mănușă departe de corp și față. Trebuie să aveți grijă pentru a preveni contaminarea mâinilor, ochilor și hainelor cu conținutul fiolei.

ATENȚIE: Se știe că fiolele pot exploda la schimbările bruște de temperatură.

Nu dezghețați în apă caldă sau cu gheață.

Din acest motiv, decongelați fiolele în apă curată la 25 °C - 27 °C.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Păsări ouătoare:

Siguranța medicamentului de uz veterinar nu a fost stabilită pe durata perioadei de ouat.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Sunt disponibile date de siguranță și eficacitate care demonstrează că vaccinul poate fi amestecat în același solvent și administrat pe calea subcutanată cu Nobilis Rismavac. Pentru această utilizare mixtă, s-a demonstrat un debut al imunității de 5 zile pentru BM.

Sunt disponibile date de siguranță și eficacitate care demonstrează că Nobilis ND Clona 30 sau Nobilis ND C2 pot fi administrate la puii de o zi vaccinați fie pe cale subcutanată, fie pe cale *in ovo* cu vaccinul. Pentru această utilizare asociată s-a demonstrat un debut al imunității de 2 săptămâni pentru ND.

Sunt disponibile date de siguranță și eficacitate care demonstrează că Nobilis IB Ma5 sau Nobilis IB 4-91 pot fi administrate la puii de o zi vaccinați fie pe cale subcutanată, fie pe cale *in ovo* cu acest vaccin.

Nu există informații disponibile referitoare la siguranță și eficacitatea vaccinului când este utilizat cu alt medicament de uz veterinar cu excepția celor menționate mai sus. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt medicament de uz veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

Supradozare:

Nu s-au observat simptome după administrarea unei doze de 10 ori mai mari de vaccin.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Orice persoană care intenționează să fabrice, să importe, să dețină, să distribuie, să vândă, să furnizeze și să utilizeze acest medicament de uz veterinar trebuie să consulte mai întâi autoritatea competentă în domeniu a statului membru respectiv referitor la politicile de vaccinare existente, deoarece aceste activități pot fi interzise într-un stat membru, pe întreg teritoriul sau o parte a teritoriului său, în conformitate cu legislația națională.

Pentru acest produs este necesară eliberarea oficială a seriei de către autoritățile de control, conform cerințelor naționale.

Incompatibilități majore:

A nu se amesteca cu nici un alt medicament de uz veterinar, cu excepția solventului furnizat pentru utilizarea cu acest produs sau cu Nobilis Rismavac.

7. Evenimente adverse

Nu se cunosc.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

După diluare, administrați o doză de vaccin de 0,2 ml per pui prin injecție subcutanată în zona gâtului sau o doză de 0,05 ml per ou prin injecție *in ovo*.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Punga de vaccin trebuie să fie rotită ușor în mod frecvent în timpul vaccinării pentru a garanta că suspensia vaccinală rămâne omogenă și că se administrează titrul corect al vaccinului (de exemplu, în timpul ședințelor lungi de vaccinare).

Pregătirea vaccinului:

Precauțiile obișnuite aseptice trebuie aplicate tuturor procedurilor de pregătire și administrare. Manipularea azotului lichid trebuie să aibă loc într-o zonă bine ventilată.

1. Folosiți solvent pentru reconstituirea vaccinurilor de păsări asociate celular. Reconstituiți vaccinul conform tabelului de mai jos:

Pentru utilizare subcutanată reconstituiți vaccinul conform tabelului:

Pungi solvent	Număr de fiole cu vaccin pentru administrare subcutanată
Pungă de 400 ml solvent	1 fiolă conținând 2000 doze
Pungă de 800 ml solvent	2 fiole conținând 2000 doze
Pungă de 800 ml solvent	1 fiolă conținând 4000 doze
Pungă de 1200 ml solvent	3 fiole conținând 2000 doze
Pungă de 1600 ml solvent	4 fiole conținând 2000 doze
Pungă de 1600 ml solvent	2 fiole conținând 4000 doze

Când acest produs este amestecat cu Nobilis Rismavac, ambele trebuie diluate în aceeași pungă de solvent în același mod (400 ml de solvent pentru fiecare 2000 de doze din ambele produse sau 800 ml de solvent pentru fiecare 4000 de doze din ambele produse).

Pentru utilizare *in ovo* reconstituiți vaccinul conform tabelului:

Pungi solvent	Număr de fiole cu vaccin pentru administrare <i>in ovo</i>
Pungă de 400 ml solvent	4 fiole conținând 2000 doze
Pungă de 400 ml solvent	2 fiole conținând 4000 doze
Pungă de 800 ml solvent	8 fiole conținând 2000 doze
Pungă de 800 ml solvent	4 fiole conținând 4000 doze
Pungă de 1200 ml solvent	12 fiole conținând 2000 doze
Pungă de 1200 ml solvent	6 fiole conținând 4000 doze
Pungă de 1600 ml solvent	16 fiole conținând 2000 doze
Pungă de 1600 ml solvent	8 fiole conținând 4000 doze

Solventul trebuie să fie clar, de culoare roșie, fără sedimente și la temperatura camerei (15 ° C -25 ° C) în momentul amestecării.

2. Pregătirea vaccinului este planificată înainte ca fiolele să fie prelevate din azot lichid și trebuie calculată mai întâi cantitatea exactă de fiole de vaccin și cantitatea de solvent necesară. Nu există informații disponibile cu privire la numărul de doze inscripționate pe fiole odată ce au fost scoase de pe canulă, astfel încât trebuie să se acorde o atenție specială pentru a se evita amestecurile de fiole cu un număr diferit de doze și să se folosească solventul corect.
3. Înainte de a retrage fiolele din recipientul cu azot lichid, protejați mâinile cu mănuși, purtați mănci lungi și folosiți o mască sau ochelari de protecție. Când scoateți o fiolă de pe canulă, țineți-o în palma cu mânușă departe de corp și față.
4. Când retrageți o canulă cu fiole din recipientul cu azot lichid, expuneți numai fiola (fiolele) care vor fi folosite imediat. Se recomandă să manevrați un număr de maximum 5 fiole (de pe o singură canulă) simultan. După îndepărtarea fiolei / fiolelor, fiolele rămase trebuie să fie introduse înapoi imediat în recipientul cu azot lichid.
5. Conținutul fiolei (fiolelor) este dezghețat rapid prin scufundarea în apă curată la 25 ° C - 27 ° C. Rotiți ușor fiola (fiolele) pentru a dispersa conținutul. Este important ca conținutul fiolei, după ce a fost dezghețat, să fie amestecat imediat în solvent pentru a proteja celulele. Uscați fiola, apoi rupeți fiola la gât și continuați imediat după cum este descris mai jos.
6. Extrageți ușor conținutul fiolei într-o seringă sterilă, cu un ac de calibru 18 G.
7. Introduceți acul prin dopul pungii cu solvent și adăugați lent și ușor conținutul seringii la solvent. Rotiți ușor și inversați punga pentru a amesteca vaccinul. Retrageți o parte din solvent în seringă pentru a clăti fiola. Scoateți soluția de spălare din fiolă și injectați-o ușor în punga cu solvent.
8. Repetați pașii 6 și 7 pentru fiole suplimentare, dacă este necesar.
9. Scoateți seringă și inversați punga (de 6–8 ori) pentru a amesteca vaccinul.
10. Vaccinul este acum gata de utilizare. După adăugarea conținutului fiolei la solvent, produsul gata de utilizare este o suspensie injectabilă limpede, de culoare roșie.

Controlul stocării corecte:

Pentru a permite verificarea depozitării corecte și a transportului fiolele sunt așezate cu vârful în jos în recipientele cu azot lichid. Dacă conținutul congelat este situat în vârful fiolei, acest lucru indică faptul că a fost dezghețat și nu trebuie utilizat.

10. Perioade de așteptare

Zero zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Concentrat:

Depozitați și transportați congelat în azot lichid (sub -140 °C).

Solvent:

A se păstra sub 30 °C.

Container:

Depozitați containerul cu azot lichid în poziție verticală într-o cameră curată, uscată și bine ventilată, separată de incubația / camera de pui din statia de incubatie.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termen de valabilitate după reconstituire conform indicațiilor: 2 ore.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

250027

Dimensiunea ambalajului:

Fiolă care conține 2,000 sau 4,000 de doze. Fiolele sunt păstrate pe o canulă și atașate la canulă este o clemă colorată care afișează doza (2,000 doze: agrafă de culoare roz-somon și 4,000 doze: agrafă de culoare galbenă).

Pungi cu solvent cu 400 ml, pungi cu 800 ml solvent, pungi cu 1200 ml solvent sau pungi cu 1600 ml solvent.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

05/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Intervet International B.V.,

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Tarile de Jos

APROBAT

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL "Zoofarmagro"

mun. Chișinău,

str. Camenița 4a,

tel/fax +373 022 855-071;

zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații

Vaccinul este un herpesvirus de curcan viu recombinat (HVT) asociat celular care exprimă proteina F a virusului bolii Newcastle și glicoproteinele gD și gI ale virusului laringotraheitei infecțioase. Vaccinul induce imunitate activă împotriva bolii Newcastle, a laringotraheitei infecțioase și a bolii Marek la pui.