

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Dana^R Spot-on, soluție

2. Compoziție

Într-un ml se conține:

Substanță activă:

Fipronil - 50 mg

Excipient(excipienți):

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Dimetilsulfoxid
Butilhidroxitoluol
Acid citric
Polisorbat - 80
Polivinilpirolidon
Limonen
Polietilenglicol - 200

Soluție de uz extern.

Se prezintă ca o soluție uleioasă, opalescentă, de culoare de la galben-pal până la galben-intens.

3. Specii țintă

Câini, pisici.

4. Indicații de utilizare

Dana^R Spot-on se indică câinilor și pisicilor de la vârsta de 12 săptămâni în tratamentul și profilaxia entomozelor provocate de purici și păduchi malofagi și hematofagi; acarozelor provocate de căpușele Sarcoptes, Ixodes și Demodex, animalelor de blană în tratamentul și profilaxia otodectozei.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți, inclusiv în anamneză.

Nu se utilizează animalelor bolnave de boli infecțioase și în perioada de convalescență, câinilor cu greutatea corporală sub 2 kg, pisicilor cu greutatea corporală sub 1 kg, tineretului cu vârsta sub 12 săptămâni.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Nu este destinat utilizării animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Acțiunea acaricidă a fipronilului începe peste 24 ore de la aplicare, deaceia tratamentul se efectuează nu mai târziu de 24 ore înainte de plimbare pe teritoriul eventual infestat cu căpușe (parcuri, scuaruri, păduri). Pentru evitarea ingerii medicamentului de uz veterinar, animalului i se îmbracă botniță sau guler de protecție, care se scoate peste 20-30 minute după tratament.

Nu se recomandă aplicarea medicamentului pe piele umedă și/sau afectată, scăldatul animalelor în rezervoarele naturale, la fel utilizarea remediilor de spălare timp de 48 ore după tratament.

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării a picăturilor, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței. În caz dacă tratamentul planificat al animalului a fost omis, acesta trebuie efectuat cât mai curând posibil în aceeași doză.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Dana^R Spot-on este necesar de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

La finisarea lucrului mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

Persoanelor cu hipesensibilitate cunoscută la substanțele active se recomandă să evite contactul direct cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de apariție a reacției alergice sau înțgerare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Gestație și lactație:

Femelelor în perioada de gestație sau lactație la necesitate se aplică sub supravegherea medicului veterinar în baza evaluării raportului beneficiu-risc.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente insectoacaricide pentru tratamentul animalelor.

Supradozare:

În caz de supradozare, animalul poate manifesta salivă abundentă, tremor muscular, vomă. În așa cazuri medicamentul se spală cu apă și săpun sau șampon, și se recurge la măsuri generale de eliminare acestui din organism.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente insectoacaricide pentru tratamentul animalelor.

7. Evenimente adverse

În cazul utilizării a zgărzii Dana^R Spot-on în conformitate cu instrucțiunile prescrise, reacții adverse și complicații nu apar.

La unele animale în caz de hipersensibilitate individuală și apariția semnelor de iritație și a reacțiilor alergice, medicamentul se spală de pe suprafața pielii cu apă și săpun și la necesitate se indică terapie desensibilizantă.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

În tratamentul și profilaxia entomozelor, în combaterea căpușelor Ixodes, Dana^R Spot-on se indică, 1 dată prin aplicare ("spot-on") pe pielea intactă și uscată în locurile inaccesibile pentru lingere (regiunea spatelui între omoplați sau regiunea gâtului la baza craniului), utilizând pipeta de volum corespunzător, în funcție de specia și greutatea corporală a animalului, în doze indicate în tabel:

Denumirea medicamentului de uz veterinar	Specia și greutatea animalului	Numărul de pipete și volumul nominal pentru un tratament
Dana ^R Spot-on pentru căței și câini până la 20 kg	Câini și căței de la 2 kg până la 10 kg	1 pipetă de 1,5 ml
	Câini și căței de la 10 kg până la 20 kg	2 pipete de 1,5 ml
Dana ^R Spot-on pentru câini mai mari de 20 kg	Câini de la 20 kg până la 40 kg	3 pipete de 1,5 ml
	Câini mai mari de 40 kg	4 pipete de 1,5 ml
Dana ^R Spot-on pentru motănași și pisici până la 3 kg	Motănași și pisici până la 3 kg	1 pipetă de 0,5 ml
Dana ^R Spot-on pentru pisici mai mari de 3 kg	Pisici mai mari de 3 kg	1 pipetă de 1,0 ml

Doza medicamentului Dana^R Spot-on în flacon din polimer a câte 15 ml constituie 1 ml (38-42 picături) pe 5 kg greutate corporală.

Pentru animalele de talie mare (greutatea corporală mai mare de 20 kg) tratamentul se va efectua prin aplicare pe piele în 3-4 locuri.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Tratamentele repetate în perioada activității maxime a paraziților se efectuează după indicații, dar nu mai des de 1 tratament pe lună, în cazul scăldărilor frecvente cu săpun sau șampon (mai mult de 2 ori pe lună) - nu mai des de 1 tratament în 2 săptămâni.

În scopuri preventive a invaziei repetate cu purici, animalelor se schimbă așternuturile sau se prelucreează cu preparate insecticide conform instrucțiunilor de utilizare.

Pentru combaterea căpușelor Ixodes pe corpul animalului se aplică 1-2 picături de Dana^R spot-on pe căpușă și locul fixării ei pe piele. Dacă timp de 20-30 minute căpușa nu cade, ea se extrage atent și se nimicește.

În tratamentul otodectozei (scabia auriculară) la câini și pisici mai întâi se sanează canalul auditiv și pavilionul urechii curățându-l de cruste și eliminări, apoi se picură în ambele urechi câte 3-5 picături de medicament și se masează baza urechii. Tratamentul se repetă de 2-3 ori cu interval de 5-7 zile. La necesitate cura se repetă.

Dana^R Spot-on se picură în mod necesar în ambele urechi, chiar dacă este afectată o singură ureche.

În caz de sarcoptoză, notoedroză sau demodecoză, medicamentul se aplică pe suprafața afectată a corpului, curățată de cruste, cu un tampon de la periferie spre centru cuprinzând 1 cm din țesutul limitrof, în doze, indicate în tabel.

În cazuri severe, se recomandă terapie complexă cu medicamente patogenetice și simptomatice.

Tratamentul se efectuează de 3-5 ori cu interval de 7-10 zile, până la însănătoșirea animalului care se confirmă cu două rezultate a cercetărilor acarologice negative.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul închis al producătorului.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra separat de produsele alimentare și hrană pentru animale.

A se păstra la T°C de la +2°C până la +25°C.

A nu se utiliza după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

190044

Pipete din metalopolimer x 0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml sau flacon din polimer cu picurător x 15 ml.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

06/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

OOO "Apicenna"

Federația Rusă, reg. Moscova, 143985, or. Balașiha, șos. Poltevskoe 4.

Tel +7(495)580-77-13

e_karbysheva@apicenna.ru

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Zoofarmagro,

mun. Chișinău, str. Camenița 4a

Tel/fax 373 022 855-071; 373 69827427

www.zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP53AX15