

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

Stop-prurit^R suspensie (*Stop-itch^R suspension*).

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

În 1 ml se conține:

Substanțe active:

Triamcinolona - 1 mg

Clorhidrat de piridoxină - 2 mg

Riboflavină - 4 mg

Nicotinamidă - 10 mg

Metionină - 20 mg.

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Glicerol
Polisorbat - 80,
Aspasvit C 200
Acid succinic
Gumă de xantan
N-carboxilmetilceluloză
Benzoat de sodiu
Sorbat de potasiu
Apă purificată

Suspensie pentru uz intern.

3. INFORMAȚII CLINICE**3.1 Specii țintă**

Câini, pisici.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Stop-prurit^R suspensie se indică câinilor și pisicilor pentru tratamentul bolilor inflamatorii și alergice a pielii (dermatită atopică, eczemă, neurodermită difuză, alopecie, reacție la înțepăturile insectelor).

3.3 Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți, inclusiv în anamneză; în perioada vaccinării, boli virale, diabet.

Nu se utilizează cățeilor și motănașilor cu vârsta sub 8 săptămâni.

3.4 Atenționări speciale

Nu sunt destinate utilizării animalelor productive.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Când se utilizează medicamentul pentru prima dată, în cazuri rare, animalele pot prezenta hipersalivație, care trece rapid.

Trebuie de evitat încălcările schemei de administrare a medicamentului, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței. În caz de omitere a unei administrări, tratamentul se reia în aceeași doză conform aceeași scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Stop-prurit^R suspensie, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută la substanțele active se recomandă să evite contactul direct cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de îngerare sau apariție a reacțiilor alergice, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3.6 Evenimente adverse

Reacții adverse sau complicații, în urma administrării conform prospectului de utilizare, nu apar.

În caz de sensibilitate individuală sporită a animalelor la componentele medicamentului se manifestă apatie, salivare, poliurie, polidipsie, dereglări gastrointestinale. În astfel de cazuri, administrarea medicamentului se stopează și la necesitate se indică terapie simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, secțiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu se indică animalelor în perioada de gestație și lactație.

3.8 Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Stop-prurit^R suspensie nu se recomandă a fi administrat concomitent cu alte medicamente de uz veterinar ce conțin hormoni corticosteroidieni.

3.9 Căi de administrare și doze

Stop-prurit^R suspensie se administrează peroral, 1 dată pe zi cu puțină hrană de dimineață sau forțat cu ajutorul unei seringi-dozator, în dozaj indicat în tabel:

Specia animalului	Greutatea animalului, kg	Doza zilnică, ml/animal
Câini	până la 10	0,5
	10-20	1,0
	20-30	1,5
	30-40	2,0
	mai mare de 40	2,0
Pisici	1-3	0,25
	3 și mai mare	0,5

Primele 4 zile suspensia se administrează în doză terapeutică, apoi următoarele 8 zile – se administrează jumătate din doza terapeutică. Cura de tratament poate fi prelungită la discreția medicului veterinar.

3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

În caz de supradozare animalul poate manifesta apatie și vomă.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioade de așteptare

Nu este cazul.

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: - QD07

4.2 Farmacodinamie

Triamcinolona din compoziția este un glucocorticoid sintetic, posedă acțiune pronunțată antiinflamatoare, antialergică și desensibilizantă.

Mecanismul lui de acțiune constă în blocarea mediatorilor inflamației eliminați de eozinofile și a prostaglandinelor care potențează procesul inflamator, stimularea biosintezei lipocortinei, care posedă acțiune antiedemică, diminuarea numărului de mastocite ce elimină acid hialuronic și scade permeabilitatea vaselor.

Vitaminele grupei B (B3, B6, B2) și metionina îmbunătățesc metabolismul, sporesc regenerarea țesuturilor, contribuie la recuperarea funcțională a stării pielii.

Stop-prurit^R suspensie după gradul de impact asupra organismului face parte din substanțele puțin toxice (clasa 4 conform GOST 12.1.007-76).

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

În absența studiilor de incompatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 14 zile.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.
A se păstra în ambalajul închis al producătorului.
A se feri de lumină directă a soarelui.
A se păstra separat de produsele alimentare și hrană pentru animale.
A se păstra la T°C de la +2°C până la +25°C.
A nu se utiliza după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon din polimer x 10 ml, 15 ml.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu legislația națională și cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO "Apicenna"

Federația Rusă, or. Moscova, r. Balașiha, șos. Poltevskoe 4.

Tel +7(495)580-77-13

7. NUMĂRUL(NUMERELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

190078

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI

13.12.2019

**9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

06/2025

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).