

PROSPECT**1. Denumirea medicamentului de uz veterinar**

REEDOX 500
pulbere orală hidrosolubilă

2. Compoziție

1 g conține:

Substanța activă

Doxicilină HCl 500 mg

Excipienți

| Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți | Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar |
|---|--|
| Colloidal Silicon dioxide | 15 mg |
| Sucroză | 479,75 mg |

Pulbere fină, de culoare galbenă până la maro-portocaliu.

3. Specii țintă

Păsări

4. Indicații de utilizare

Tratamentul (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) infecțiilor bacteriene: boala respiratorie cronică (CRD), coriza, micoplasmoza, sinusite, sinovite, colibaciloze, holera, salmoneloză, spirochetoză, enterita necrotică, enterite, diarei bacteriene, etc.

5. Contraindicații

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la tetraciclone sau la oricare dintre excipienți.
Nu se utilizează la animalele cu afecțiuni hepatice grave și / sau deficiențe renale.

6. Atenționări specialeAtenționări speciale

A nu se administra la cabaline, câini și pisici.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Este recomandat ca tratamentele să se inițieze după efectuarea antibiogrammei. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează produsul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tetraciclone trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu se utilizează la păsări de la care se obțin ouă destinate consumului uman.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar sau alte forme de interacțiune

În timpul tratamentului, sărurile minerale vor fi excluse din apa cu medicament.

REEDOX 500 nu trebuie utilizat concomitent cu penicilinele și cefalosporinele, din cauza posibilității antagonismului a acțiunii bactericide a penicinelor, în special atunci când este necesară o acțiune rapidă bactericidă.

Supradozare:

Nu se cunosc.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Nu se cunosc.

7. Evenimente adverse

Leziuni renale și/sau ototoxicitate, reacții de hipersensibilitate cum ar fi tulburările gastro-intestinale sau modificări ale florei intestinale.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Se administrează pe cale orală.

La păsari: 40g/200 litri de apă timp de 4-5 zile continuu.

În furaj se administrează 0,5 kg/tona

9. Recomandări privind administrarea corectă

Apa de băut medicamentată trebuie proaspăt preparată la fiecare 24 de ore.

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acuratețe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

10. Perioade de așteptare

Carne și organe: 7 zile

A nu se utiliza găinilor pentru producția de ouă destinate consumului uman.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se depozita la o temperatură sub 30° C.

Termenul de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 de zile.

După dizolvarea în apă a se folosi timp de 24 ore.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

230146

Flacoane din plastic x 100g, 250g, 500g, 1kg, 5kg.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

04/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

REEFCO, Al Reef Company for Manufacturing Veterinary Drugs & Agrochemicals, IORDANIA, Irbid – Al hassan Industrial Estate, Tel. 0096227395106, info@reef-co.com

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Sumagrovvet Prim,
mun. Chișinău, str. Muncești 293 B,
e-mail: info@sumagro.md, tel. 079458824

17. Alte informații

Codul ATCvet: QJ01AA02

