

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

EXPRESS Tabs, comprimate pentru câini cu greutatea 5 kg
EXPRESS Tabs, comprimate pentru câini cu greutatea 10 kg
EXPRESS Tabs, comprimate pentru câini cu greutatea 30 kg

2. Compoziție

Un comprimat conține:

Substanța activă:

	spinosad	moxidectină	praziquantel
Pentru câini cu greutatea 5 kg	150 mg	1 mg	25 mg
Pentru câini cu greutatea 10 kg	300 mg	2 mg	50 mg
Pentru câini cu greutatea 30 kg	900 mg	6 mg	150 mg

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Lactoză
Aditiv aromatizant „aromă de carne”
Amidon de porumb pregelatinizat
Stearat de calciu

Comprimate biconvexe de culoare de la alb sau gri până la maro deschis cu incluziuni, cu una sau două linii pe o parte și un logo pe cealaltă. Logo-ul nu este prevăzut pentru comprimate în modificarea „pentru câini cu greutatea de 5 kg”.

3. Specii țintă

Câini.

4. Indicații de utilizare

Express Tabs este prescris câinilor adulți și cățelelor pentru tratamentul și prevenirea bolilor parazitare asociate cauzate de purici, acarieni (Ixodida, Sarcoptiformes, Trombidiformes), păduchi, nematode și cestode, pentru prevenirea dirofilariozei cauzate de larve *Dirofilaria immitis* și *Dirofilaria repens*, precum și reducerea riscului de infectare cu boli transmise de căpușe.

5. Contraindicații

Contraindicații pentru utilizarea ExpressTabs este sensibilitatea individuală crescută a animalului la componentele medicamentului (inclusiv în anamneză), epuizare, boli infecțioase, epilepsie, hipertermie, disfuncție hepatică și renală.

Nu se recomandă utilizarea medicamentului la animale din alte specii, precum și la câini cu greutatea mai mică de 1,25 kg, cățele în timpul gestației și alăptării, căței cu vârsta sub 8 săptămâni. Medicamentul nu trebuie utilizat la rasele de câini sensibile la lactone macrociclice, inclusiv Ciobănesc Australian (Aussie), Ciobănesc Alb, Bobtail (ciobănesc englez vechi), Border Collie, Collie cu păr scurt, Collie cu păr lung, McNab, Whippet cu părul lung, Silken Windhound, Sheltie și metișii acestora, precum și câini cu sensibilitate crescută determinată genetic (insuficiența MDR1).

6. Atenționări specialeAtenționări speciale:

Nu este indicat animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Evitați încălcarea schemei de administrare a medicamentelor, deoarece acest lucru poate duce la o scădere a eficacității terapeutice. În cazul omiterii următorului tratament, administrarea medicamentului trebuie reluată în aceeași doză și conform aceleiași scheme de tratament.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Atunci când se lucrează cu Express Tabs, trebuie respectate regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, așa cum sunt prevăzute în cazul lucrului cu medicamente de uz veterinar. Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Express Tabs.

După utilizare mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă.

În caz de reacții alergice sau ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactați imediat o unitate medicală (să aveți la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

Gestație și lactație:

Este interzisă utilizarea medicamentului de uz veterinar la cățele în timpul gestației și alăptării.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Express Tabs nu trebuie utilizat simultan cu și/sau în decurs de 6 săptămâni de la ultima utilizare a medicamentelor antihelmintice care conțin lactone macrociclice (milbemicin, moxidectin, abamectin, aversectin, doramectin, ivermectin și eprinomectin), cu medicamente care inhibă colinesteraza și piperazina.

Nu există informații privind incompatibilitatea medicamentului cu medicamente din alte grupuri farmacologice, furaje și aditivi furajeri cunoscuți.

Supradozare:

În caz de supradozaj medicamentos la animal pot fi observate anorexie, vomă, diaree, salivăție, ataxie, depresie, midriază (dilație pupilelor), tremor muscular, excitabilitate nervoasă, fotofobie, convulsii. În aceste cazuri, animalului i se prescriu enterosorbente și terapie simptomatică.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

7. Evenimente adverse

Frecvente (1 până la 10 animale / 100 de animale tratate):	hipersalivație, vomă, diaree, refuz de hrană, depresie, ataxie, tremor muscular, midriază (dilatare pupilelor), excitabilitate nervoasă, fotofobie;
Foarte rare (<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate):	sunt posibile convulsii

Aceste simptome dispar, de obicei, spontan, nu necesită utilizarea de medicamente și nu se observă la utilizare repetată. În cazul unei sensibilități individuale crescute a animalului la componentele medicamentului și/sau la tratarea unui animal cu microfilaremie pronunțată, se prescriu antihistaminice și terapie simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar.

De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Express Tabs se administrează animalelor individual, o singură dată, pe cale orală (intern) cu o cantitate mică de hrană (deliciu) în timpul hrănirii sau se administrează la rădăcina limbii imediat după hrănire.

Doza terapeutică (pe substanțe active) a medicamentului **pentru 1 kg greutate corporală** este: **30 mg spinosad + 5 mg praziquantel + 0,2 mg moxidectină.**

Dozele de Express Tabs în funcție de greutatea animalului, modificarea și ambalajul utilizat al comprimatelor sunt prezentate în tabel:

Greutatea corporală (g/c), kg	Ambalajul produsului			
	Câini cu greutatea corporală până la 5 kg	Câini cu greutatea corporală de la 5 până la 10 kg	Câini cu greutatea corporală de la 15 până la 30 kg	Câini cu greutatea corporală de la 30 până la 60 kg
	Modificarea medicamentului (numărul de comprimate, buc.)			
	Pentru câini cu g/c 5 kg (1 comprimat la 5 kg g/c)	Pentru câini cu g/c 10 kg (1 comprimat la 10 kg g/c)	Pentru câini cu g/c 30 kg (1 comprimat la 30 kg g/c)	
1,25 - 2	¼ (pătrime) de comprimat	-	-	-
2,1 - 3	½ (jumătate) de comprimat	-	-	-
4 - 5	1 comprimat	½ (jumătate) de comprimat	-	-
6 - 8	1 pastilă + ½ (jumătate) de comprimat	½ (jumătate) de comprimat + ¼ (pătrime) de comprimat	-	-
9 - 10	2 comprimate	1 comprimat	-	-
11-14	-	1 comprimat + ¼ (pătrime) de comprimat	-	-
15	-	1 comprimat + ½ (jumătate) de comprimat	½ (jumătate) de comprimat	
16 - 20	-	2 comprimate	½ (jumătate) de comprimat + ¼ (pătrime) de comprimat	
21 - 25	-	2 comprimate + ½ (jumătate) de comprimat		
26 - 30	-	-	1 comprimat	
31 - 40	-	-	1 comprimat + ¼ (pătrime) de comprimat	
41 - 45	-	-	1 comprimat + ½ (jumătate) de comprimat	
46 - 60	-	-	2 comprimate	
> 60*	Combi-nații de comprimate în raport cu greutatea corporală a câinilor			

*Când medicamentul se utilizează la câini cu o greutate corporală mai mare de 60 kg, trebuie selectată o combinație de comprimate cu modificări corespunzătoare.

De exemplu: două comprimate „Pentru câini cu greutatea corporală de 30 kg”, plus suplimentar un număr necesar de comprimate „Pentru câini cu greutatea corporală de 10 kg”, din calcul - un comprimat pentru fiecare 10 kg suplimentare din greutatea corporală a animalului.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Pentru a preveni posibilele reacții adverse la animalele sensibile, este permisă împărțirea dozei de medicament în două părți egale, cu administrare ulterioară la un interval de 3-5 ore.

Este necesar să vă asigurați că animalul a înghițit întreaga doză necesară de Express Tabs. Când se utilizează medicamentul cu hrană, este permisă zdrobirea comprimatelor.

Când animalele sunt ținute în grupuri, se recomandă tratarea simultană a tuturor animalelor.

Tratamentele repetate ale animalelor se efectuează la intervale de 6-8 săptămâni pe parcursul întregului sezon de activitate a ectoparaziților.

Pentru a asigura un efect protector împotriva căpușelor Ixodida, medicamentul trebuie administrat cu cel puțin 24 de ore înainte de plimbarea preconizată a animalelor în locurile în care pot trăi căpușe (parcuri, piețe, păduri).

Pentru a preveni reinfestarea cu ectoparaziți, zonele de locuit ale animalului, așternutul și păturile sunt tratate cu un insecticid, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a acestuia.

În caz de helmintoze a tractului gastrointestinal, dehelmintizarea repetată se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai devreme de 1,5 luni (6 săptămâni) după acest tratament.

În scopul prevenirii dirofilariozei în regiunile nefavorabile de boală, medicamentul se utilizează în perioada de zbor a țânțarilor, în perioada primăvară-vară-toamnă, începând utilizarea acestuia cu o lună înainte de începerea zborului țânțarilor, apoi la fiecare 1,5 luni până la sfârșitul sezonului, ultimul tratament efectuându-se peste o lună după sfârșitul zborului insectelor.

Tratamentul demodeciei, sarcoptozei și otodectozei se recomandă a fi efectuat în combinație cu utilizarea de medicamente a terapiei simptomatice și patogenetice.

În tratamentul formelor generalizate de boli, medicamentul se administrează de 2-3 ori la intervale de 6 săptămâni până la recuperare, confirmată de rezultatele cercetărilor acarologice.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se feri de lumina directă a soarelui.

A se păstra la temperatură de la +2°C până la + 25°C.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

EXPRESS Tabs, comprimate pentru câini cu greutatea 5 kg - 250065
EXPRESS Tabs, comprimate pentru câini cu greutatea 10 kg - 250066
EXPRESS Tabs, comprimate pentru câini cu greutatea 30 kg - 250067

Blistere a câte 1, 2 și 3 comprimate, ambalate individual într-o cutie de carton, împreună cu prospectul de utilizare.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

09/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

SRL "AVZ SP", Federația Rusă,
141305, Regiunea Moscova, r-1 Serghiev-Posadsky, or. Serghiev Posad, str. Tsentralinaya, nr. 1/11
Linie telefonică directă disponibilă 24 /24 ore: 8-800-700-19-93.
Informații despre medicament sunt postate pe site-ul www.avzvet.ru

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL "ZooFarmAgro", MD-2001, mun. Chișinău, str. Camenița, 4a
tel.: (022) 855 073; tel.:(022) 355 240; gsm.: 069 827 427
e-mail: zoofarmagro@mail.ru; www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: spinosad- QP53BX03, moxidectină- QP54AB02; praziquantel -QP62AA51

