

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

TURIL 2,5%, soluție orală

2. Compoziție

1 ml de soluție conține, mg:

Toltrazuril - 25.

Excipienți: trietanolamină, polietilenglicol.

3. Specii țintă

Păsări (pui broiler și de înlocuire), curcani.

4. Indicații de utilizare

Tratamentul puilor (pui de carne, pui tineri de înlocuire), curcanilor în eimerioză cauzată de eimerii sensibile la toltrazuril:

- la pui: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*;

- la curcani: *Eimeria adenoides*, *E. meleagris*, *E. meleagrimitis*.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă toltrazuril.

Nu se utilizează la găinile ouătoare ale căror ouă sunt destinate consumului uman.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Administrarea similară altor antiparazitare, utilizarea frecventă și repetată a antiprotozoarelor din aceeași clasă terapeutică poate duce la dezvoltarea rezistenței.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu Turil 2,5%, soluție orală trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute atunci când lucrați cu medicamente de uz veterinar.

În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie spălate imediat cu multă apă.

A nu se mânca, a nu se bea și a nu se fuma în timpul manipulării sau în timp ce se administrează medicamentul de uz veterinar la animale.

Păsări ouătoare:

Nu se utilizează la păsările ouătoare.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se utilizează simultan cu alte preparate coccidiostatice.

Supradozare:

Nu are proprietăți cumulative.

Cazuri de acțiune negativă a medicamentului, provocate de supradozare nu sunt cunoscute.

În caz de supradoze de 10 ori mai mare decât doza recomandată scade consumul de apă potabilă.

Incompatibilități majore

În lipsa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

Păsări (pui broiler și de înlocuire), curcani.

Evenimente adverse nu sunt observate în cazul administrării în doze recomandate.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Înainte de utilizare, medicamentul este amestecat bine cu apă potabilă și administrat păsărilor în doză de 1 ml Turil 2,5% (25 mg toltrazuril) la 1 litru de apă potabilă timp de 48 ore, sau în doză de 3 ml Turil 2,5% (75 mg toltrazuril) la 1 litru de apă potabilă atunci când se bea timp de 8 ore pe zi, 2 zile consecutiv.

Ambele scheme de tratament corespund aproximativ dozei de 7 mg toltrazuril/kg greutate corporală/zi.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Dacă apar sedimente, soluția trebuie agitată bine înainte de utilizare.

Pentru un tratament eficient, se recomandă utilizarea medicamentului de uz veterinar la păsări înainte de apariția semnelor clinice ale bolii - în timpul perioadei de incubație.

10. Perioade de așteptare

Carne - 11 zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la +5°C până la +25°C.

A se păstra în loc uscat, a se feri de lumină.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

250073

Flacoane neutre din sticlă de marca NS-1, NS-2, USP-1 sau din polimer de 100, 200 ml.
Recipiente (flacoane) din polimer conform TU U 23455985-001, de 1 l.
Canistre din polimer de 5 l.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului
12/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

SRL „Vetsintez” Ucraina, 61001, Harkov, st. Smolnaia, 30
Telefon/fax: +38 (057) 757-84-71; +38 (057) 714-37-51
E-mail: info@vetsintez.com.ua

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova, SA „Farmavet”, MD-2059, Republica Moldova, Chișinău, str. Petricani 198.
Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax: 31-72-68; www.farmavet.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP51BC01

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME

BY
NATHANIEL BENTLEY

IN TWO VOLUMES.

VOLUME THE SECOND.

BOSTON: PUBLISHED BY
J. B. BENTLEY, 1825.

NEW-YORK: J. B. BENTLEY, 1825.

PHILADELPHIA: J. B. BENTLEY, 1825.

CHICAGO: J. B. BENTLEY, 1825.

ST. LOUIS: J. B. BENTLEY, 1825.

INDIANAPOLIS: J. B. BENTLEY, 1825.

CINCINNATI: J. B. BENTLEY, 1825.

CLEVELAND: J. B. BENTLEY, 1825.

COLUMBUS: J. B. BENTLEY, 1825.

DAYTON: J. B. BENTLEY, 1825.

DETROIT: J. B. BENTLEY, 1825.

INDIANAPOLIS: J. B. BENTLEY, 1825.

INDIANAPOLIS: J. B. BENTLEY, 1825.

INDIANAPOLIS: J. B. BENTLEY, 1825.

INDIANAPOLIS: J. B. BENTLEY, 1825.

INDIANAPOLIS: J. B. BENTLEY, 1825.

INDIANAPOLIS: J. B. BENTLEY, 1825.