

## PROSPECTUL

### 1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

#### ANTIPAR

### 2. Compoziție

1 ml conține:

**Substanța activă:**

Verde malahit - 0,2% (2 mg);

Formalină – 10% (100 mg).

**Excipienți:** apă distilată până la 1 ml.

Soluție transparentă de culoare albastru întunecat.

### 3. Specii țintă

Pești decorativi de acvariu.

### 4. Indicații de utilizare

Antipar este recomandat pentru tratamentul și prevenirea bolilor infecțioase și parazitare ale peștilor decorativi precum: necroza înotătoarelor, saprolegnioză, ihtioftirius, criptocarionoză, chilodoneleză, tricofrioză, criptobioză, apiosomiază, oodinioză, brooklynelloză, heteropolarioză, tetrahimeneză, uronemoză, tricoftioză, costiază, dactiligiroză, girodactiloză.

### 5. Contraindicații

Este interzisă utilizarea medicamentului de uz veterinar pentru tratarea peștilor dintr-un acvariu cu organisme acvatice nevertebrate.

### 6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Antipar nu este destinat tratării peștelor care sunt destinate în consum unman.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Evitați încălcarea schemei de tratament, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea. În cazul omiterii uneia sau mai multor doze, tratamentul trebuie reluat cât mai curând posibil în doza recomandată.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Antipar e important de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

În timpul lucrului nu sunt permise fumatul, consumul de băuturi și alimente.

După finisarea lucrului trebuie spălate bine mâinile cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Antipar.

În caz de reacții alergice sau ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactați imediat o unitate medicală (să aveți la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu este cazul.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Antipar nu trebuie utilizat împreună cu medicamentele care conțin săruri de argint, mercur și cupru, oxidanți și baze.

Supradozare:

În caz de supradozaj al medicamentului, la pești este posibilă dereglarea echilibrului și coordonării mișcărilor (înot rapid și haotic). În acest caz, peștii trebuie transferați imediat într-un recipient cu apă curată.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Antipar este incompatibil cu medicamentele care conțin săruri de argint, mercur și cupru, oxidanți și baze.

**7. Evenimente adverse**

În cazul utilizării medicamentului Antipar, în conformitate cu indicațiile prescrise, efecte secundare și complicații la pești în general nu se observă. În caz dacă unele specii de pești de acvariu sunt hipersensibile la medicament și apar complicații, tratamentul se întrerupe, iar peștii se transferă într-un acvariu cu apă curată.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: [mvnotificare@ansa.gov.md](mailto:mvnotificare@ansa.gov.md), tel. 022-210-156.

**8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare**

Antipar se utilizează prin metoda băilor de scurtă sau de lungă durată.

În scop preventiv, se efectuează o dată băi de scurtă durată, utilizând medicamentul în doză de 1 ml la 10 litri de apă, cu un timp de expunere de 3 ore.

În scop terapeutic, se efectuează de două ori băi de scurtă durată, cu un interval de 24 de ore, utilizând medicamentul în doză de 1 ml la 10 litri de apă, cu o expunere de 3 ore, sau băile de lungă durată, utilizând medicamentul în doză de 1 ml de medicament la 50 litri de apă, cu o expunere de la 3 zile până la 8 zile (până la dispariția semnelor clinice ale bolii).

Înainte de efectuarea băilor de scurtă durată dintr-un acvariu (bazin) nefavorabil la boală se prind 2-3 pești cu semne clinice pronunțate ale bolii și se plasează într-un recipient cu o soluție medicamentată (1 ml de medicament la 10 litri de apă) și se observă peștii timp de 15 minute.

Dacă peștii prezintă semne de anxietate (mișcări bruște, neobișnuite), aceștia sunt transferați în apă curată.

Dacă peștii nu prezintă complicații, atunci sunt tratați toți peștii din acvariu (bazin).

Pentru aceasta, peștii sunt prinși într-o cușcă, care este plasată într-o soluție medicamentată. După o expunere de 3 ore, cușca este transferată în acvariu (bazin) principal, lăsând peștii în ea până la următorul tratament. După tratamente repetate, peștii sunt eliberați din cușcă în acvariu (bazin).

Băile de lungă durată sunt utilizate pentru a trata peștii foarte sensibili la medicamente și transferuri, precum și peștii tineri. În acest scop, Antipar se adaugă într-un acvariu sau bazin cu pești decorativi în proporție de 1 ml la 50 l de apă, se sting corpurile de iluminat și se asigură o bună aerare a apei.

În timpul tratamentului, la fiecare 3 zile se adaugă în apă 1/2 din doza terapeutică a medicamentului.  
Dacă este necesar, tratamentul poate fi repetat după 5 zile.

#### **9. Recomandări privind administrarea corectă**

Filtrele nu se utilizează în timpul tratamentului peștilor, vegetația acvatică și solul nu se îndepărtează din acvariu. Temperatura din acvariu trebuie menținută la + 24°C - +26°C, iar pH-ul - 5,5-6,8.

După finalizarea procedurii de tratament, apa din acvariu este dezactivată prin trecerea acesteia printr-un filtru de carbon.

Pentru acvariile cu pești bolnavi, trebuie prevăzute echipamente separate (plase, pulverizatoare, hrănitore, cuști, raclete, termometre etc.).

#### **10. Perioade de așteptare**

Nu este cazul.

#### **11. Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la 0°C până la 25°C.

A se păstra separat de alimente și furaje.

A se păstra în loc uscat.

A se feri de lumina directă a soarelui.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

#### **12. Precauții speciale pentru eliminare**

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

#### **13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar**

Medicament de uz veterinar se eliberează fără prescripție.

#### **14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor**

250090

Antipar este produs în sticle de polietilenă cu volum de 15 ml, sigilate cu capace de polimer cu filet, ambalate în cutii individuale de carton.

#### **15. Data ultimei revizuirii a prospectului**

12/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

#### **16. Date de contact**

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

SRL «AVZ S-P», Federația Rusă, 141300, Regiunea Moscova, or. Serghiev Posad, str. Ţentralinaya, 1/11.

Informații despre medicament sunt postate pe site-ul [www.avzvet.ru](http://www.avzvet.ru)

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

**Republica Moldova**

SRL "ZooFarmAgro",

MD-2001, mun. Chișinău, str. Camenița, 4a

tel.: (022) 855 073; tel.: (022) 355 240; gsm.: 069 827 427

e-mail: zoofarmagro@mail.ru;

www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

**17. Alte informații -**

Codul ATCvet: QD08AX